

1<sup>er</sup> ENCUENTRO  
MÉDICO-FARMACÉUTICO  
FORMULACIÓN  
MAGISTRAL  
EN DERMATOLOGÍA


---

Dermatitis atópica y  
otros trastornos de  
la piel en la edad  
pediátrica.

Miguel Lova Navarro  
Francesc Llambí Mateos  
25 de octubre de 2019



# Tratamiento Dermatitis atópica



## CONSEJOS

Ropa de Algodón (No fibra ni lana)

Higiene: 5 días Ducha corta / 2 días Baño (Geles que no hagan espuma)

Piscina:

+ Sal mejor (Si se puede)

+ Piscina Cloro:

Crema barrera previa al baño

Después del baño retirar cloro y aplicar crema hidratante

+ No suspender alimentos de manera indiscriminada

Sólo suspender aquellos alimentos a los cuales se ha comprobado que es alérgico

# ¿Cómo trato la Dermatitis atópica?

+ NO APLICAR NUNCA CREMA HIDRATANTE SOBRE LA PIEL LESIONADA (Eccemas):

- Aplicar Cremas hidratantes para prevenir brotes
- Si aplicamos cremas hidratantes en el brote el eccema empeorará

+ EN LA PIEL LESIONADA (Eccemas):

- Corticoides tópicos
- ó
- Inmunomoduladores tópicos

Nota.-

También se pueden emplear corticoides diluidos con crema hidratante

# Potencia de los corticoides tópicos (De Martindale)

Tabla II. Corticoides tópicos clasificados según la potencia

Clase 1 o potencia muy alta	Clase 2 o potencia alta	Clase 3 o potencia intermedia	Clase 4 o potencia débil
– Betametasona dipropionato 0,05%	– Betametasona dipropionato 0,05%	– Alclometadona dipropionato 0,05%	– Desonida 0,05%
– Clobetasol propionato 0,05%	– Betametasona valerato 0,1%	– Beclometasona dipropionato 0,025%	– Dexametasona 0,1-0,2%
– Difluocortolona valerato 0,3%	– Budesonida 0,025%	– Betametasona valerato 0,1%	– Fluocortina 0,75%
– Halcinónido 0,1%	– Desoximetasona 0,25%	– Clobetasol butirato 0,05%	– Hidrocortisona acetato 0,1-2,5%
	– Flucortolona valerato 0,1%	– Desoximetasona 0,05%	– Metilprednisolona acetato 0,25%
	– Fluocinolona acetónido 0,2%	– Flucortina butilesterato 0,75%	
	– Fluocinónido 0,05%	– Fluocortolona	
	– Fluticasona propionato 0,05%	– Flumetasona pivalato 0,025%	
	– Halometasona 0,05%	– Fluorcinolona acetónido < 0,01%	
	– Hidrocortisona butirato 0,1%	– Flurandrenolona 0,0125%	
	– Metilprednisolona aceponato 0,1%	– Hidrocortisona aceponato 0,1%	
	– Mometasona furoato 0,1%	– Hidrocortisona valerato 0,2%	
	– Prednicarato 0,25%		
	– Triamcinolona acetónido 0,1%		

La potencia relativa de algunos productos depende de la forma galénica utilizada (ungüento, pomada, crema, gel, loción).

Después del baño con piel húmeda

Corticoides tópicos de cuarta generación

Rápida biotransformación en productos de degradación con escasa o nula actividad sistémica y alta efectividad tópica



# Tratamiento de la D.A

## Inhibidores de la calcineurina

·MDA: Inhibición calcineurina-> bloqueo respuesta inmunológica

### INMUNOMODULADORES

·Eficacia : similar corticoides tópicos **potencia media.**

·Efectos adversos: **irritación transitoria** (15 % pacientes)

·*No aprobado < 2 años.. 0,1% en mayores de 16 años*



Crema Hidratante

Corticoides tópicos

o

Inmunomoduladores tópicos:

Primer paso: Dos veces al día hasta control del brote (10-15 días)

Segundo paso: Lunes y Jueves de mantenimiento según la evolución

Crema Hidratante

